

Rococlos vet.

Rotavirus suis, Escherichia coli,

Clostridium perfringens

injektionsvätska, emulsion



Egenskaper

Rococlos vet. är ett two-shot inaktiverat vaccin som stimulerar produktionen av neutraliserande antikroppar mot porcint rotavirus och fimbriala antikroppar mot *E. coli* samt antikroppar mot *Clostridium perfringens*

Djurslag

Gris (dräktiga gyltor och suggor)

Indikationer

För passiv immunisering av nyfödda spädgrisar genom aktiv immunisering av dräktiga gyltor och suggor för att minska:

- Kliniska tecken (neonatal diarré, kräkningar och anorexi) orsakad av porcint rotavirus.
- Kliniska tecken (neonatal diarré) och dödlighet orsakad av *E. coli*-stammar som uttrycker fimbrieadhesinerna F4ac, F5, F6 och F41.
- Kliniska tecken (neonatal diarré, enterit) och dödlighet orsakad av beta-toxin (uttryckt av *Clostridium perfringens*).

Dosering och administrering

Vaccindos: 2 ml, i.m. - Administrera i nackmuskeln bakom örat.

Dräktiga gyltor och suggor

Grundvaccination - 2 administreringar av en dos med 2 veckors intervall:

- Första dosen 4 veckor före förväntad födsel
- Andra dosen 2 veckor före förväntad födsel

Revaccination:

- Under efterföljande dräktigheter: administrering av en dos 2 veckor före förväntad födsel

Förpackning

1 x 50 ml (Vnr 57 18 48)

Se baksidan för mer information.



Rococlos vet.

Rotavirus suis, Escherichia coli, Clostridium perfringens
injektionsvätska, emulsion

Läkemedelsform

Injektionsvätska, emulsion

Djurslag

Gris (dräktiga gyltor och suggor)

Indikationer

För passiv immunisering av nyfödda spädkgrisar genom aktiv immunisering av dräktiga gyltor och suggor för att minska: Kliniska tecken (neonatal diarré, kräkningar och anorexi) orsakad av porcint rotavirus. Kliniska tecken (neonatal diarré) och dödlighet orsakad av *E. coli*-stammar som uttrycker fimbrieadhesinerna F4ac, F5, F6 och F41. Kliniska tecken (neonatal diarré, enterit) och dödlighet orsakad av beta-toxin (uttryckt av *Clostridium perfringens*).

Immunitetens insättande: Passiv immunitet börjar när spädkgrisarna diar och är beroende av att spädkgrisarna får i sig tillräckligt med råmjölk och mjölk från vaccinerade mödrar efter födseln. Skydd hos spädkgrisarna för indikationerna ovan visades för: *E. coli* stammar: inom 12 timmar efter födseln. Rotavirus: vid 5 dagars ålder. *Clostridium perfringens*, typ C, beta-toxoid: vid 2 dagars ålder. Immunitetens varaktighet: Visades baserat på experimentell infektion: 3 veckors ålder.

Dos och administreringssätt

Vaccindos: 2 ml, IM - Administrera i nackmuskulerna bakom örat. Dräktiga gyltor och suggor: Grundvaccination: 2 administreringar av en dos med 2 veckors intervall: Första dosen 4 veckor före förväntad födsel. Andra dosen 2 veckor före förväntad födsel. Revaccination: Under efterföljande dräktigheter: administrering av en dos 2 veckor före förväntad födsel

Överdoser

Ej relevant.

Kontraindikationer

Inga.

Biverkningar

Förhöjd temperatur, svullnad vid injektionsstället.

Interaktioner

Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel.

Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

Vaccinera endast friska djur. Det första intaget av råmjölk för varje spädkgris i kullen ska ske inom de första 6-8 timmarna efter födseln. Särskilda försiktighetsåtgärder för djur: Ej relevant. Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur: Ej relevant.

Dräktighet och laktation

Dräktighet: Användas under dräktighet enligt vaccinationsschemat beskrivet i avsnitt Dosering.

Karenstider

Noll dygn

Hållbarhet

Oöppnad: 2 år. Öppnad: 10 timmar.

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras och transporteras kallt (2°C–8 °C). Får ej frysas. Skyddas mot ljus.

Förpackningsstorlek:

1 x 50 ml

ATC-kod:

QI09A L09

Innehavare av godkännande för försäljning

Bioveta, a.s., Komenského 212/12, 683 23 Ivanovice na Hané, Tjeckien.

För fullständig SPC se www.fass.se

Ombud: Salfarm Scandinavia AB, Florettgatan 29C 2 vån,
254 67 Helsingborg, Tlf: 0767-834810, Email: scan@salfarm.com

Texten har blivit omskriven och/eller förkortad.