

# Tylogran®

tylosintartrat 1000 mg/g

granulat för användning i dricksvatten/mjölk



## Egenskaper

Tylogran® är ett makrolidantibiotikum med snabb distribution till alla vävnader utom hjärna och ryggmärg. Koncentrationen av tylosin är högre i vävnad än i plasma.

## Djurslag

Grisar, kalvar, kalkoner och kycklingar.

## Indikationer

- Gris: Pneumoni (*M. hyopneumoniae* och *M. hyorhinis*)  
PIA/Ileit (*L. intracellularis*)
- Kalvar: Pneumoni (*Mycoplasma spp.*)
- Kalkoner: Infektiös sinusit (*M. gallisepticum*)
- Kycklingar: CRD (*M. gallisepticum* och *M. synoviae*)  
Nekrotiserande enterit (*C. perfringens*)

## Dosering och administrering

Administrering: p.o.

### Dosering:

- Grisar: *Mycoplasma*: 2,2 g/100 kg djur i 10 dagar.  
*Lawsonia*: 0,55-1,1 g/100 kg djur i 7 dagar.
- Kalvar: Lunginflammation: 1,1-2,2 g/100 kg djur 2 x dgl i 7-14 dagar.
- Kalkoner: Infektiös sinusit: 8,25-11 g/100 kg djur i 3-5 dagar.
- Kycklingar: CRD: 8,25-11 g/100 kg djur i 3-5 dagar.  
Nekrotiserande enterit: 2,2 g/100 kg djur i 3 dagar.

## Karenstid

- Slakt: Kalvar: 12 dygn.  
Grisar: 1 dygn.  
Kalkoner: 2 dygn.  
Kycklingar: 1 dygn.
- Ägg: 0 dygn.

## Förpackning

550 gram (Vnr 53 94 39)

Se baksidan för mer information.



**salfarm**  
www.salfarm.com

Antibiotikum

# Tylogran®

tylosintartrat 1000 mg/g  
granulat för användning i dricksvatten/mjölk

## Läkemedelsform

Granulat för användning i dricksvatten/mjölk.

## Djurslag

Kalv, gris, kyckling och kalkon.

## Indikationer

**Kalvar:** behandling och metafylax av:

- pneumoni orsakad av *Mycoplasma* spp.

**Svin:** behandling och metafylax av:

- enzootisk pneumoni orsakad av *Mycoplasma hyopneumoniae* och *Mycoplasma hyorhinis*;
- porcin intestinal adenomatos (PIA eller Ileit) associerad med *Lawsonia intracellularis*.

**Kalkoner:** behandling och metafylax av:

- infektiös sinusit orsakad av *Mycoplasma gallisepticum*.

**Kycklingar:** behandling och metafylax av:

- kroniska luftvägssjukdomar (CRD) orsakade av *Mycoplasma gallisepticum* och *Mycoplasma synoviae*;
- nekrotiserande enterit orsakad av *Clostridium perfringens*.

Förekomst av sjukdomen i gruppen/flocken måste fastställas innan läkemedlet används.

## Dos och administreringsätt

Administrering: p.o.

**Grisar:** *Mycoplasma*: 2,2 g/100 kg djur i 10 dagar.

*Lawsonia*: 0,55-1,1 g/100 kg djur i 7 dagar.

**Kalvar:** Lunginflammation: 1,1-2,2 g/100 kg djur 2 x dgl i 7-14 dagar.

**Kalkoner:** Infektiös sinuit: 8,25-11 g/100 kg djur i 3-5 dagar.

**Kycklingar:** CRD: 8,25-11 g/100 kg djur i 3-5 dagar.

Nekrotiserande enterit: 2,2 g/100 kg djur i 3 dagar.

## Överdoser

Det finns inga tecken på toxicitet vid orala doser på upp till tre gånger rekommenderad dos.

## Kontraindikationer

Överkänslighet mot tylosin eller andra makrolider. Djur med nedsatt leverfunktion. Använd inte till hästar.

## Biverkningar

Gris: Diarré, klåda, hudrodnad, svullnad av vulva, rektalt ödem, rektalt prolaps.

## Interaktioner

Antagonism med lincosamid förekommer. Används inte till djur som vaccinerats med tylosinkänsliga vacciner, antingen samtidigt eller inom senaste veckan.

## Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

Allvarligt sjuka djur som har ett förändrat ät- och dryckesbeteende bör medicineras parenteralt. Ska inte användas i fall av känd resistens mot tylosin eller korsresistens mot andra makrolider.

**Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:** Bakteriologisk provtagning och känslighetstest rekommenderas. Användning som avviker från produktresumén kan öka prevalensen av resistens och kan minska effekten av behandling med andra makrolider på grund av korsresistens. Officiella och lokala antimikrobiella riktlinjer ska beaktas. Lämna inte eller kassera vatten som innehåller tylosintartrat där det kan vara tillgängligt för antingen djur som inte behandlas eller vilda djur.. **Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur:** Kan orsaka irritation och överkänslighet. Kan leda till korsreaktioner med andra makrolider och vice versa. Allergiska reaktioner kan vara allvarliga. Undvik direktkontakt. Använd överdragskläder, ogenomsläppliga handskar och antingen en halvmask för engångsbruk som överensstämmer med europeisk standard EN149 eller en gasmask för flergångsbruk som överensstämmer med europeisk standard EN140, med ett filter för EN143. Tvätta händerna efter användning. Vid oavsiktlig hudkontakt, skölj noggrant med tvål och vatten. Vid oavsiktlig kontakt med ögonen, skölj ögonen med rikliga mängder rent, rinnande vatten. Personer med känd överkänslighet mot tylosin eller andra makrolider bör inte hantera läkemedlet. Om du utvecklar symtom efter exponering, som t.ex. hudutslag, ska du söka medicinsk vård och visa läkaren denna var-

ning. Svullnad av ansikte, läppar och ögon, eller andningssvårigheter är mer allvarliga symtom och kräver akut medicinsk vård.

## Dräktighet och laktation

Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet, laktation eller äggläggning.

## Karenstider

Kalv (kött och slaktbiprodukter): 12 dygn.

Svin (kött och slaktbiprodukter): 1 dygn.

Kalkon (kött och slaktbiprodukter): 2 dygn. Kalkon (ägg): noll dygn.

Kyckling (kött och slaktbiprodukter): 1 dygn. Kyckling (ägg): noll dygn.

## Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning:

Burk (PP-förpackning): 2 år.

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 3 månader.

Hållbarhet efter beredning i dricksvatten: 24 timmar.

Hållbarhet efter beredning i mjölk: 3 timmar.

## Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras under 25 °C. Förvaras ej i kylskåp. Får ej frysas. Skyddas mot frost.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Dricksvatten med läkemedel ska skyddas mot ljus.

## Förpackningsstorlek::

550 g

## ATC-kod:

QJ01FA90.

## Innehavare av godkännande för försäljning

Dopharma Research B.V., Zalmweg 24, 4941 VX, Raamsdonksveer, Holland.

För fullständig SPC se [www.fass.se](http://www.fass.se)

Ombud: Salfarm Scandinavia AB, Florettgatan 29C 2 vän,  
254 67 Helsingborg, Tlf: 0767-834810, Email: [scan@salfarm.com](mailto:scan@salfarm.com)

Texten har blivit omskriven och/eller förkortad.