

Hantering

ARTI-CELL® FORTE

(Injektionsvätska till häst)



TORRIS

Torris kan vara skadligt för hud, ögon och luftvägar. Läs och följ säkerhetsinstruktionerna som beskrivs i medföljande dokument. "Säkerhetsinstruktioner för torris".



LEVERANS

ARTI-CELL® FORTE levereras på torris.

Var god kontrollera paketen omgående vi leverans, var uppmärksam på att längsta leveranstid inte har överskridits.

PAKETET FÅR ÖPPNAS FÖRST NÄR PATIENTEN ÄR REDO ATT INJICERAS

Produkten skall användas innan hållbarhetstiden utlöper eller så länge det finns torris kvar nog att bibehålla kylförmågan hos varan även innan hållbarhetsiden överskridits

Skall produkten lagras lokalt i frysar med ultralåg temperatur eller på flytande nitrogen, skall produkten flyttas till dessa omedelbart efter att varan mottagits.



LAGRING

ARTI-CELL® FORTE ska lagras och transporteras nedfruset (-90 C till -70 C) eller i flytande nitrogen.

VIKTIGT: Produkten ska administreras omgående efter upptining för att förhindra betydande celldöd.



FÖRBEREDELSE

Förbered patienten för intraartikulär injektion. Det veterinära läkemedlet ska hanteras med steril teknik i en ren miljö.



Vänligen vänd >>>

ARTI-CELL® FORTE

(Injektionsvätska till häst)



UPPTINING

Använd passande handskar för att ta upp de två ampullerna från torrisen/flytande nitrogenbehållaren och tina upp dom till ca 25 C- 37 C. Tina upp i händerna eller i vattenbad tills dess att innehållet i ampullerna är helt tinat.



VISUELL BEDÖMNING

Om det efter upptining är synliga klumpar av celler i någon av ampullerna, skaka ampullen försiktigt tills dess suspensionen är klar och färglös (stamcellsuspension) eller klar och gul (allogen plasmasuspension).



BLANDA

Efter upptining dras suspensionerna från bägge ampullerna direkt in i samma spruta. Vänd sprutan ett par gånger för att blanda de två komponenterna.

Vid ledinjektion av ARTI-CELL® FORTE ska det användas en kanyl som är 22 G eller större.

