

Dryseal vet.

vismutsubnitrat 2,6 g/spruta
intramammär suspension



Egenskaper

Genom användning av **Dryseal vet** under sinperioden minskas förekomsten av klinisk mastit under nästa laktation.

Infusion av **Dryseal vet** skapar en försegling i spenen som direkt ger en långvarig fysisk barriär mot inträngning av bakterier.

Djurslag

Nötkreatur (mjölkkor vid sinläggning).

Indikationer

Förebyggande av nya intramammära infektioner under sinperioden.

På kor som sannolikt är fria från subklinisk mastit kan läkemedlet användas fristående för skydd mot infektioner under sinperioden och mastitkontroll.

Dosering och administrering

Intramammär användning.

Applicera innehållet av en spruta i varje spene omedelbart efter den sista mjölkningen i laktationen (vid sinläggningen). Man måste vara försiktig så att inga patogener förs in i spenen, detta för att minska risken för mastit efter infusionen. Det är mycket viktigt att spenen rengörs och desinficeras noga med de medföljande spritimpregnerade desinfektionsservetterna eller annan lämplig teknik.

Karenstid

Kött och slaktbiprodukter: Noll dygn.

Mjolk: Noll timmar.

Förpackning

Kartong med 24 sprutor + 24 desinfektionsservetter
(Vnr. 14 04 37)

Plastbehållare med 160 sprutor + 160 desinfektionsservetter (Vnr. 42 43 95)

Se baksidan för mer information.



salfarm
www.salfarm.com

Mastit

Dryseal vet.

vismutsbinitrat 2,6 g/spruta
intramammär suspension

Djurslag

Nötkreatur (mjölkkor vid sinläggning).

Indikationer

Förebyggande av nya intramammära infektioner under sinperioden. På kor som sannolikt är fria från subklinisk mastit kan läkemedlet användas fristående för skydd mot infektioner under sinperioden och mastitkontroll.

Dos och administreringssätt

Intramammär användning. Spruta innehållet av en spruta med läkemedlet i varje spene omedelbart efter den sista mjölkningen i laktationen (vid sinläggningen). Massera inte spenen eller juvret efter infusion av produkten eftersom det är viktigt att förseglingen stannar kvar i själva spenen och inte kommer in i juvret. Det rekommenderas att komprimera spenen vid dess bas under appliceringen. Man måste vara försiktig så att inga patogener förs in i spenen, detta för att minska risken för mastit efter infusionen. Det är mycket viktigt att spenen rengörs och desinficeras noga med de medföljande spritimpregnerade desinfektionsservetterna eller annan lämplig teknik, eftersom det veterinärmedicinska läkemedlet inte har någon antimikrobiell verkan. Spenarna ska torkas av tills desinfektionsservetterna inte längre blir synligt smutsiga. Spenarna ska få torka före infusionen. Spruta in aseptiskt och undvik att smutsa ned sprutmunstycket. Efter infusion är det tillrådligt att använda lämpligt spendopp/spray. Vid lägre temperaturer kan produkten värmas till rumstemperatur i en varm miljö utan risk för kontaminering för att öka sprutbarheten.

Överdoser

Dubbla mängden av rekommenderad dos har administrerats utan några kliniska biverkningar.

Kontraindikationer

Använd inte på lakterande kor. Används inte som fristående behandling på kor som har subklinisk mastit vid sinläggning. Använd inte på kor med klinisk mastit vid sinläggning. Använd inte vid överkänslighet mot aktiva substans/hjälpämnen.

Biverkningar

Mycket sällsynt: Akut mastit

Interaktioner

I kliniska provningar har kompatibiliteten för läkemedlet endast påvisats med ett preparat för sinkor som innehåller kloxacillin.

Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

Användning rekommenderas som en del av besättningsens hälsoplan för att förebygga nya intramammära infektioner. Veterinärens kliniska bedömning ska ligga till grund för vilka kor som väljs ut för behandling. Urvalskriterierna kan baseras på historisk information om mastit och somatiskt celltal. Särskilda försiktighetsåtgärder för djur: Korna bör regelbundet kontrolleras för klinisk mastit. Vid klinisk mastit i en förseglad juverdel ska den drabbade delen mjölkas ur manuellt innan lämplig terapi inleds. För att minska risken för kontamination får sprutorna inte sänkas eller doppas i vatten. Använd sprutan endast en gång. Läkemedlet har ingen antimikrobiell effekt och för att undvika akut mastit som en följd av bristfällig hygien och administreringsteknik, är det av största vikt att följa aseptiska administreringstekniken. Ge inte annan intramammär produkt efter administrering. Till kor som kan ha subklinisk mastit kan produkten användas efter att lämplig antibiotikabehandling för sinkor administrerats i den infekterade juverdelen. Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur: Personer med känd överkänslighet mot vismutsalt eller paraffin bör undvika kontakt. Kan orsaka hud- och ögonirritation. Undvik kontakt med hud och ögon. Gummihandskar ska användas vid hantering. Vid kontakt med hud eller ögon ska det drabbade området tvättas noggrant med vatten. Om irritationen kvarstår, kontakta läkare och visa bipacksedel/etiketten. Desinfektionsservetter: innehåller isopropylalkohol och kan därför orsaka hud- och ögonirritation. Undvik kontakt med ögonen. Undvik långvarig kontakt med huden. Tvätta händerna efter användning.

Dräktighet och laktation

Dräktighet: Kan användas under dräktighet. Vid kalvning kan kalven få i sig förseglingen; det är riskfritt och orsakar inte biverkningar.

Laktation: Använd inte under laktation.

Karenstider

Kött och slaktbiprodukter: Noll dygn. Mjolk: Noll timmar.

Hållbarhet

Oöppnad: 2 år. Öppnad: använd omedelbart.

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras ej i kylskåp. Får ej frysas. Skyddas mot ljus.

Förpackningsstorlek

Kartong med 24 sprutor + 24 desinfektionsservetter.
Plastbehållare med 160 sprutor + 160 desinfektionsservetter.

ATC-kod: QG52X

Innehavare av godkännande för försäljning

Bioveta a.s.
Komenského 212/12
683 23 Ivanovice na Hané
Tjeckien.

För fullständig SPC se www.fass.se

Ombud: Salfarm Scandinavia AB, Florettgatan 29C 2 vån,
254 67 Helsingborg, Tlf: 0767-834810, Email: scan@salfarm.com

Texten har blivit omskriven och/eller förkortad.