

Neuton Vet

sulfadiazin 200 mg, trimetoprim 40 mg

injektionsvätska, lösning



Egenskaper

Neuton Vet är ett bredspektrumantibiotikum.

Neuton Vet absorberas snabbt efter injektion och sprids i hela kroppen.

Neuton Vet utsöndras huvudsakligen via njurarna och i mindre grad via gallan.

Djurslag

Gris, nötkreatur, häst, hund och katt.

Indikationer

Behandling av systemiska infektioner orsakade av eller associerade med organismer som är känsliga för kombinationen av trimetoprim och sulfadiazin.

Dosering och administrering

Gris och nötkreatur: 1 ml/16 kg i.m. eller långsam i.v.

Häst: 1 ml/16 kg långsam i.v.

Hund och katt: 1 ml/8 kg s.c.

Behandlingen kan upprepas till två dagar efter att symtomen har försvunnit, upp till maximalt fem dagar.

OBS: max 15 ml i.m. på ett injektionsställe.

Karenstid

Gris: Kött och slaktbiprodukter: 20 dygn.

Nötkreatur: Kött och slaktbiprodukter: 12 dygn.
Mjölk: 48 timmar.

Häst: Kött och slaktbiprodukter: 28 dygn.
Ej godkänt för användning till ston som producerar mjölk för humankonsumtion.

Förpackning

1 x 100 ml (Vnr 16 03 26)

Se baksidan för mer information.



Neuton Vet.

sulfadiazin 200 mg, trimetoprim 40 mg
injektionsvätska, lösning

Läkemedelsform

Injektionsvätska, lösning

Djurslag

Gris, nötkreatur, häst, hund och katt.

Indikationer

Behandling av systemiska infektioner orsakade av eller associerade med organismer som är känsliga för kombinationen av trimetoprim och sulfadiazin.

Dos och administreringsätt

Intramuskulär, intravenös eller subkutan administrering.

Nötkreatur, svin och hästar: 12,5 mg sulfadiazin + 2,5 mg trimetoprim/kg kroppsvikt. Detta motsvarar 1 ml av läkemedlet /16 kg kroppsvikt. Nötkreatur och svin: Administrera intramuskulärt eller långsam intravenös injektion. Den rekommenderade maximala volymen som ska administreras intramuskulärt på ett enda injektionsställe är: 15 ml av produkten. Hästar: Får endast administreras via långsam intravenös injektion. Hundar och katter: 25 mg sulfadiazin + 5 mg trimetoprim/kg kroppsvikt. Detta motsvarar 1 ml av läkemedlet /8 kg kroppsvikt. Endast administrering via subkutan injektion. Behandlingen kan upprepas till två dagar efter att symtomen har försvunnit, upp till maximalt fem dagar.

Överdoser

Kristalluri samt nerv- och hematiska störningar kan förekomma.

I händelse av överdosering, avbryt behandlingen och administrera rikligt med vatten och folsyra.

Kontraindikationer

Använd inte vid överkänslighet. Får ej användas intraperitonealt. Använd ej i fall av allvarliga lever- eller njurskador eller blod dyskrasier. Använd ej i fall av minskat vattenintag eller förlust av kroppsvätska. Använd ej för hästar som behandlats med läkemedel som kan framkalla rubbningar av hjärtrytmen, såsom vissa bedövningsmedel och lugnande medel (t.ex. detomidin).

Biverkningar

Anafylaktisk chock, svullnad på appliceringsstället och/eller ömhet, kristalluri, hematuri, obstruktion eller stopp i urinvägarna, blod dyskrasi.

Interaktioner

Får ej administreras med 4-aminobensoesyra (PABA). Lokalbedövningsmedel från gruppen av PABA-estrar (prokain, tetrakain) kan lokalt hämma sulfonamidernas effekt. Får ej administreras med orala antikoagulantia eller medel som används för surgörande av urin. Fall av dödliga hjärtarytmier har observerats på grund av interaktion mellan kombinationen av sulfonamid och trimetoprim och vissa medel för att bedöva och söva hästar (t.ex. detomidin).

Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur: Användning av läkemedlet bör baseras på identifiering och känslighetstestning av patogenerna. Användning av läkemedlet bör ske i enlighet med officiella antimikrobiella riktlinjer. Användning på annat sätt än angivet kan öka förekomsten av bakterieresistens. Det bör alltid finnas tillräckligt med dricksvatten tillgängligt. IV användas med försiktighet. Vid IV: Man har observerat hjärt- och andningskollaps hos hästar. Vid första tecken på intolerans ska injektionen avbrytas och chockbehandling inledas. Uppvärmas till kroppstemperatur och injiceras långsamt.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur: Kan orsaka en allergisk reaktion. Personer med känd överkänslighet ska undvika kontakt. Undvik oavsiktlig självinjektion eller hudkontakt. I händelse av oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa bipacksedel/förpackningen. Kvinnor i fertil ålder, gravida kvinnor eller kvinnor som misstänker att de kan vara gravida, bör använda läkemedlet med stor försiktighet för att undvika oavsiktlig självinjektion. Kan orsaka hud- och ögonirritation. Undvik kontakt med hud och ögon. Vid kontakt med hud eller ögon, skölj omedelbart med mycket vatten. Om du utvecklar symptom efter exponering, t. ex. hudutslag, bör du söka läkarhjälp och visa läkaren bipacksedeln. Svullnad i ansiktet, läpparna eller ögonen, eller andningssvårigheter, är allvarigare symptom och kräver omedelbar läkarhjälp. Tvätta händerna efter användning.

Dräktighet och laktation

Säkerheten hos läkemedlet har inte fastställts hos nötkreatur, svin, hästar, hundar och katter. Laboratoriestudier på kaniner och möss har visat tecken på toxiska effekter på foster. Använd endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta-riskbedömning.

Karenstider

Nötkreatur: Kött och slaktbiprodukter: 12 dygn. Mjolk: 48 timmar. Svin: Kött och slaktbiprodukter: 20 dygn. Hästar: Kött och slaktbiprodukter: 28 dygn. Ej godkänt för användning till ston som producerar mjölk för humankonsumtion.

Hållbarhet

Oöppnad: 2 år. Öppnad: 28 dygn.

Särskilda förvaringsanvisningar

Får ej frysas. Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Kristallisering av produkten kan uppstå vid låga temperaturer. Detta avhjälps genom en långsam och försiktig uppvärmning.

Förpackningsstorlek: 1 x 100 ml

ATC-kod: QJ01EW10

Innehavare av godkännande för försäljning

Cenvisa S.L, Camí Pedra Estela s/n, 43205 Reus, Spanien.

För fullständig SPC se www.fass.se

Ombud: Salfarm Scandinavia AB, Florettgatan 29C 2 vån,
254 67 Helsingborg, Tlf: 0767-834810, Email: scan@salfarm.com

Texten har blivit omskriven och/eller förkortad.